

## **Sifilis – Informații pentru pacienți**

### Important de reținut

Sifilisul este o infecție cu transmitere sexuală.

Se transmite cu ușurință de la o persoană la alta în timpul actului sexual, inclusiv prin sex oral.

De multe ori nu produce niciun fel de manifestări.

Tratamentul este simplu.

Dacă nu este tratat, sifilisul poate determina probleme serioase de sănătate pe termen lung.

Vă puteți proteja folosind ÎNTOTDEAUNA prezervativul atunci când faceți sex.

### Ce este sifilisul?

Sifilisul este o infecție cu transmitere sexuală. Este determinată de o bacterie numită *Treponema pallidum*.

### Cum se poate lua sifilisul?

Pacientul se poate infecta atunci când are contact sexual cu o persoană care este deja infectată. Se poate întâmpla în cazul contactului sexual vaginal, oral sau anal. Femeile însărcinate pot să transmită infecția copilului.

Infecția este mai frecventă în rândul bărbaților care au relații sexuale cu alți bărbați, a persoanelor care își schimbă frecvent partenerii sexuali și care nu folosesc prezervativ în timpul actului sexual.

Chiar dacă pacientul a avut sifilis la un moment dat, acesta se poate reinfecta.

### Care sunt manifestările sifilisului?

Manifestările sunt aceleași, atât la bărbați cât și la femei. Sunt 4 stadii ale infecției:

- *Sifilis primar*. Un ulcer (șancru) se dezvoltă în locul pe unde bacteria intră în corp.

De obicei acesta apare după 2-3 săptămâni de la actul sexual cu persoana infectantă,

însă poate să apară oricând pe o perioadă de până la 3 luni. Cel mai frecvent este un ulcer nedureros care apare mai des la nivelul penisului la bărbați, pe vulvă sau vagin la femei sau la nivel anal. În funcție de locul apariției acesta poate fi observat sau nu. Ulcerul se poate vindeca în 6 săptămâni și este foarte contagios pentru partenerii sexuali.

Ocazional pot să apară mai multe ulcere, pot fi dureroase sau localizate la nivelul gurii sau buzelor.

- *Sifilis secundar*. Sifilisul secundar se dezvoltă în 3 până la 6 săptămâni de la apariția ulcerului dacă nu se administrează tratament. Acesta este produs de bacteria care se răspândește prin fluxul sangvin. Se poate observa o erupție pe piele, ce afectează frecvent palmele și talpile, se pot observa umflături în zona genitală, pete albe în gură, ganglioni măriți sau, mai rar, căderea părului, surditate, probleme oculare, inflamația ficatului, a rinichilor sau a creierului. Sifilisul secundar este foarte contagios pentru partenerii sexuali.

Fără tratament, erupția cutanată și celelalte manifestări dispar cel mai frecvent după câteva săptămâni. Totuși, manifestările pot să apară și să dispară pe o perioadă de până la 2 ani.

- *Sifilis latent (ascuns)*. După ce manifestările sifilisului secundar dispar pot să nu mai existe alte simptome timp de câțiva ani; totuși infecția poate fi pusă în evidență prin analize de sânge.

- *Sifilis terțiar*. Dacă nu se tratează, o persoană din 10 infectate cu sifilis va avea afectare importantă a sistemului nervos, oaselor sau a inimii. Aceste probleme pot să apară după mulți ani de aparentă manifestare a bolii.

#### Sunt necesare anumite teste de laborator?

Da, de la nivelul ulcerăției ce poate fi cauzată de sifilis se poate recolta o probă pentru precizarea diagnosticului. Este necesară de asemenea și recoltarea unei probe de sânge ce va fi testată pentru anticorpi împotriva bacteriei ce produce sifilisul. Uneori este posibil ca testul pentru sifilis să nu fie pozitiv imediat, de aceea este necesară repetarea sa.

Dacă pacientul a venit în contact cu o persoană infectată cu sifilis sau are manifestări ce pot fi determinate de sifilis trebuie să se adreseze medicului de familie sau unui medic dermato-venerolog.

Dacă pacientul are sifilis, trebuie să fie testat și pentru alte boli cu transmitere sexuală deoarece poate avea mai multe infecții în același timp. Trebuie să se efectueze și un test pentru infecția HIV.

### Care este tratamentul pentru sifilis?

Este important să se efectueze tratamentul cât mai repede posibil, pentru că, netratată, infecția poate determina complicații și probleme serioase de sănătate.

Sifilisul se tratează cu antibiotice, de obicei cu penicilină, cu administrare sub formă de injecție.

### Contactul sexual la pacienții cu sifilis

Se recomandă evitarea oricărui contact sexual, inclusiv cu prezervativ, până ce pacientul și partenerul/partenera termină tot tratamentul și manifestările bolii au dispărut.

### Care sunt posibilele complicații ale sifilisului?

Dacă este tratat rapid, este puțin probabil ca sifilisul să creeze probleme pe termen lung. Totuși, fără tratament, sifilisul se poate răspândi și la nivelul altor zone ale organismului și poate cauza probleme serioase.

În 1 din 10 cazuri de sifilis netratate, bacteria se poate răspândi prin fluxul sangvin și poate cauza infecții în alte zone ale organismului (ca sistemul osos, creier și inimă). Acest lucru poate deveni evident după câțiva ani de evoluție silențioasă a bolii.

Chiar în cazul efectuării tratamentului pentru sifilis, unele teste de sânge vor rămâne pozitive. Acest lucru nu presupune efectuarea tratamentului în continuare, însă pacientul trebuie să rețină că a efectuat tratament pentru sifilis, să păstreze o copie a rezultatelor analizelor de sânge și să precizeze acest lucru medicilor atunci când este întrebat.

### Sifilisul și sarcina

Dacă pacienta este însărcinată, sifilisul poate fi transmis copilului pe parcursul sarcinii. În acest caz poate determina întreruperea spontană a sarcinii, moarte fetală intrauterină sau probleme serioase de sănătate ale copilului (sifilis congenital). Pentru evitarea acestei situații, mama trebuie să efectueze tratament pe parcursul sarcinii. Pacientele diagnosticate cu sifilis, pot efectua în siguranță tratamentul în timpul sarcinii.

### Anunțul partenerului/partenerii

Conform legislației în vigoare este esențial ca partenerul/partenera sexual(ă) actual(ă) și toți partenerii/partenerii sexuale avute în timpul ultimelor trei luni, în cazul unui sifilis primar și în ultimii 2 ani, în cazul unui sifilis secundar, să fie informate / informați despre infecția existentă și să fie testate/testați și tratați/tratați.

Această acțiune este necesară pentru ca pacientul să nu se reinfecteze și de asemenea pentru ca partenerii/partenerii pacientului să nu dezvolte complicații.

Ajutor sau alte informații

Daca se suspectează infecția cu *Treponema pallidum* sau orice altă infecție transmisibilă sexual se recomandă adresarea către medicul de familie sau un medic dermatovenerolog.

Copyright © IUSTI 2017

Website: <http://www.iusti.org/>

Date of publication: 2017

Versiunea în limba română - Clinica 2 Dermatologie – Spitalul Clinic Colentina

Dr. Anca Mihaela Tudorache

Dr. Fabiola Copaci

Dr. Bashar Basim

Dr. Adelina-Maria Sendrea

Prof. Dr. George-Sorin Țiplica