

### **Punti Chiave**

Il linfogranuloma venereo (LGV) è una infezione sessualmente trasmessa.

In Europa, quasi tutti i casi di LGV sono stati riscontrati in uomini che avevano avuto rapporti sessuali con altri uomini (MSM).

Il linfogranuloma venereo (LGV) viene trasmesso da persona a persona tramite il rapporto sessuale.

Spesso l'infezione non genera sintomi.

Il trattamento è semplice.

Nel caso in cui il linfogranuloma venereo non venga trattato, esso può causare seri problemi di salute nel lungo termine.

### **Che cos'è il linfogranuloma venereo (LGV)?**

- ❖ Il linfogranuloma venereo (LGV) è una malattia sessualmente trasmissibile causata da un batterio chiamato *Chlamydia Trachomatis L1-L3*. (Questi sono diversi tipi di ceppi batterici che possono causare l'infezione da clamidia).

### **Come viene trasmesso il LGV?**

- ❖ Si può contrarre la malattia tramite un rapporto sessuale con una persona che è già affetta da LGV. (già contratto l'infezione). Questo può accadere durante un rapporto anale, fisting, con la condivisione di sex toys o più raramente tramite rapporto orale.
- ❖ In Europa, quasi tutti i casi di LGV sono stati riscontrati in uomini che avevano avuto un rapporto sessuale con altri uomini (MSM), soprattutto tra quelli HIV positivi.
- ❖ Gli uomini che hanno multipli partner o hanno rapporti sessuali in luoghi pubblici come le saune sono più a rischio di infezione.
- ❖ In caso di pregresso LGV trattato con beneficio, si può contrarre la malattia nuovamente.

### **Quali sono sintomi del LGV?**

- ❖ L'infezione da *Chlamydia Trachomatis* (LGV) potrebbe non determinare alcun sintomo di malattia.
- ❖ I sintomi più comuni di infezione sono dolore rettale, presenza di sangue nelle feci, costipazione e tenesmo (percezione di incompleto svuotamento intestinale).
- ❖ Potrebbero essere presenti pustole non dolorose nell'area ano-genitale che potrebbero degenerare ad ulcere. Queste ulcere guariscono in alcuni giorni senza trattamento. Potrebbero esserci perdite uretrali o anali.
- ❖ Tra le 2 e le 6 settimane dopo l'infezione potrebbe comparire linfadenomegalia inguinale (ingrossamento dei linfonodi inguinali) che possono evolvere in ascessi da cui potrebbe drenare pus. La linfadenomegalia addominale (ingrossamento dei linfonodi addominali) potrebbe causare dolore addominale o dolore lombare.
- ❖ Allo stesso tempo potrebbero comparire febbre, brividi, malessere generale, dolore muscolare o alle articolazioni.

### **Devo eseguire qualche test?**

- ❖ Se un uomo, che ha rapporti anali con un altro uomo, presenta sintomi suggestivi di LGV è necessario raccogliere un campione dai genitali o dall'ano per poter eseguire una diagnosi.

## LGV in MSM - Foglio informativo per il paziente Linfogranuloma venereo



- ❖ Se si è stati in contatto con persone affette da LGV o altre infezioni sessualmente trasmissibili, o si presentano sintomi suggestivi di LGV è necessario recarsi dal proprio Medico di Medicina Generale, dallo specialista Dermatologo Venereologo o all'ambulatorio MTS (malattie sessualmente trasmissibili).
- ❖ Il medico o un'infermiera preleverà un campione dalle ulcere genitali o anali negli uomini che hanno avuto rapporti anali con altri uomini, e spedisce il campione in laboratorio per poter isolare il batterio che causa il LGV. In caso di linfadenomegalia, un campione potrebbe essere raccolto dal pus degli ascessi inguinali.
- ❖ In caso di positività per LGV è necessario eseguire un controllo anche per altre malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV, la sifilide e la gonorrea, poiché potrebbero essere presenti più infezioni nello stesso momento.

### Qual è il trattamento per il linfogranuloma venereo (LGV)?

- ❖ Il trattamento per LGV consiste in 3 settimane di terapia antibiotica, generalmente doxiciclina o eritromicina.
- ❖ E' molto importante iniziare la terapia il prima possibile poiché l'infezione può causare complicazioni e seri problemi di salute se non viene trattata.

### Posso avere rapporti sessuali se sono affetto da linfogranuloma venereo (LGV)?

- ❖ E' opportuno evitare i rapporti sessuali (anche i rapporti protetti con preservativo) fino a quando il trattamento non sarà concluso per entrambi i partner e la sintomatologia sarà scomparsa.

### Quali sono le possibili complicanze del LGV?

- ❖ E' improbabile che il LGV causi problemi a lungo termine se trattato precocemente. Tuttavia, in assenza di trattamento, l'infezione può propagarsi in tutto il corpo causando seri problemi come artriti, problemi epatici e polmonari. Raramente la diffusione del batterio può causare infezione cardiaca e cerebrale.
- ❖ Infine, in assenza di trattamento, l'infiammazione dell'ano o dei genitali potrebbe causare edema e ulcere che causano dolore cronico e problemi intestinali.

### Devo parlarne con il mio partner?

- ❖ Nel caso in cui si è affetti da LGV è essenziale che il partner corrente e tutti i partner sessuali degli ultimi 3 mesi vengano visitati, esaminati/controllati e trattati.
- ❖ Questo è indispensabile per prevenire re-infezioni e per evitare l'insorgenza di complicazioni nel partner.

### Ulteriori informazioni

- ❖ Se si sospetta di essere affetti da LGV o da altre malattie sessualmente trasmissibili è il caso di recarsi dal proprio Medico di Medicina Generale, dallo specialista Dermatologo Venereologo o all'ambulatorio MTS (malattie sessualmente trasmissibili).

Traduzione italiana: Prof. Dr. Paolo Gisondi, Prof. Dr. Giovanna Zambruno