

## Основне особине

Гонореја је полно преносива болест  
Преноси се приликом незаштићеног сексуалног односа, укључујући и орални секс

Често не даје симптоме

Уколико се гонореја не лечи или не третира адекватним антибиотицима, може довести до озбиљних и трајних здравствених последица  
Можете се заштитити уколико током сексуалних односа УВЕК користите кондом

## Шта је гонореја?

- ❖ Гонореја је полно преносива болест, чији је узрочник бактерија-*Neisseria gonorrhoeae*.

## Како се гонореја преноси?

- ❖ Гонореју можете добити путем сексуалног односа са особом која је већ заражена, било да је у питању вагинални, орални или анални секс.
- ❖ Повећана учесталост ове полно преносиве болести је међу млађом популацијом, мушкарцима који имају секс са мушкарцима (МСМ), код особа склоних честом мењању сексуалних партнера, као и оних који практикују незаштићен сексуални однос.
- ❖ Иако сте имали гонореју раније, могућа је поновна реинфекција.

## Који су симптоми гонореје?

- ❖ Више од 50% жена и 10% мушкараца заражених гонорејом немају симптоме инфекције. Инфекције ректума и грла често су асимптоматске.
- ❖ Најчешћи симптоми код жена су:
  - Појачан вагинални секрет или промене у боји и мирису истог
  - Обилна менструална крварења или крварења између циклуса
  - Крварење након сексуалног односа
  - Пецкање током мокрења
  - Бол или нелагодност у доњем пределу трбуха
- ❖ Најчешћи симптоми код мушкараца су:
  - Пецкање приликом уринирања
  - Секрет из уретре (пениса)
  - Бол или нелагодност у тестисима

# Gonorrhoea - Информациони летак за пацијенте

## Да ли је потребно тестирати се?

- ❖ Да, за дијагностиковање гонореје потребан је узорак из гениталне регије. У неким установама за дијагностиковање гонореје може се користити узорак урина. Такође, узорак се може узети из грла и ануса.
- ❖ Уколико мислите да сте били у контакту са особом која има гонореју, или друге инфекције, или имате симптоме које се могу приписати гонореји, онда је индикуван преглед код Вашег лекара опште праксе или надлежног дерматолога.
- ❖ Доктор или обучена медицинска сестра узима брис из пениса или грлића материце (цервикса) и шаље узорак одговарајућој лабораторији где ће бити тестиран на *Neisseria gonorrhoeae*. Уколико сте упражњавали орални или анални секс неопходно је обавестити доктора, како би био узет и брис грла и ануса.
- ❖ Уколико имате гонореју, такође, је потребно да се тестирате на друге полно преносиве болести, као што су ХИВ, сифилис и хламидија (*HIV*, *Syphilis* и *Chlamydia*) јер можете имати више од једне инфекције истовремено.

## Како се лечи гонореја?

- ❖ Неопходно је да се што раније примени одговарајућа терапија, како би се спречиле могуће компликације и озбиљнији здравствени проблеми.
- ❖ Гонореја се лечи са једним, некада и са два различита антибиотика, од којих се један најчешће даје парентерално.
- ❖ Особе инфициране гонорејом врло често имају и инфекцију хламидијом. Из тог разлога, препоручује се третман обе инфекције истовремено.

## Да ли да упражњавам секс уколико имам гонореју?

- ❖ За време терапије, односно док се сви симптоми не повуку код Вас и Вашег партнера, препоручује се апстиненција (уздржавање од сексуалних односа).

# Gonorrhoea - Информациони летак за пацијенте

## Које су могуће компликације гонореје?

- ❖ Гонореја ретко када доводи до дуготрајних компликација уколико се реагује на време. Ипак, ако се не лечи, гонореја може довести до озбиљних проблема.
- ❖ Код жена се може развити пелвична инфламаторна болест (ПИБ) што доводи до бола у абдомену и карлици. ПИБ, такође, може довести до инфертилитета и ектопичне трудноће (ванматеричне трудноће). Код мушкараца се може развити упала тестиса (*orchitis*).
- ❖ У ретким случајевима, уколико се не лечи, гонореја може путем крвотока да се прошири и на друге делове тела као што су Ваша кожа и зглобови.

## Гонореја и трудноћа

- ❖ Уколико сте трудни, гонореја се може пренети са мајке на дете током вагиналног порођаја. Најчешће долази до инфекције ока (*conjunctivitis*), што даље може довести до слепила уколико се не лечи.

## Да ли морам обавестити свог партнера?

- ❖ Уколико имате гонореју, од кључног је значаја да Ваш садашњи партнер и било који други сексуални партнери, које сте имали у претходна два месеца, буду тестирани и лечени.
- ❖ Циљ овога је да се спречи Ваша реинфекција, као и да Ваши партнери не развију компликације проузроковане инфекцијом.

## Додатна помоћ и информације

- ❖ Уколико сумањте да имате гонореју или неку другу полно преносиву болест, потребно је да се обратите Вашем лекару опште праксе или надлежном дерматологу.

Превели на српски са енглеског оригинала:

Др Игор Капетановић

Др Тамара Митић

Проф. др Милош Николић

Translated into Serbian from the English original:

Igor Kapetanović, MD

Tamara Mitić, MD

Professor Miloš Nikolić, MD, PhD