

Lymphogranuloma venereum (LGV) - Информациони летак за пацијенте

Основне особине

Lymphogranuloma venereum је полно преносива болест
Скоро сви детектовани случајеви у Европи срећу се код МСМ (мушкарци који имају секс са мушкарацима)

Преноси се са особе на особу путем сексуалног односа

Често не даје симптоме

Терапија је једноставна

Уколико се *LGV* не лечи адекватним антибиотицима, може довести до озбиљних и трајних здравствених последица

Шта је *Lymphogranuloma venereum (LGV)*?

- ❖ *Lymphogranuloma venereum (LGV)* је полно преносива болест, чији је узročник бактерија-*Chlamyida trachomatis L1-L3*. (Овај серотип се разликује од серотипа који је узročник инфекције хламидијом).

Како се *Lymphogranuloma venereum (LGV)* преноси?

- ❖ *Lymphogranuloma venereum (LGV)* можете добити путем сексуалног односа са особом која је већ заражена, било да је у питању анални секс, „*fisting*“, размена сексуалних играчака, и ретко путем оралног секса.
- ❖ Скоро сви случајеви *LGV*-а евидентирани у Европи су мушкарци који имају сексуалне односе са мушкарацима (МСМ), нарочито уколико су *HIV* позитивни.
- ❖ Највећем ризику су изложени мушкарци који имају више сексуалних партнера и упражњавају односе на јавним местима, нарочито у саунама.
- ❖ Иако сте имали *LGV* раније, могућа је реинфекција.

Који су симптоми *Lymphogranuloma venereum (LGV)*?

- ❖ *LGV* инфекција може бити асимптоматска, тј. без симптома.
- ❖ Најчешћи симптоми су бол у ректуму, крвави ректални исцедак, опстипација и осећај непотпуног пражњења црева (*tenesmus*).
- ❖ У гениталној или ректалној регији се могу наћи мале безболне пустуле које могу направити улцерацију која зараста без терапије након неколико дана. Можете приметити исцедак из пениса или ректума.
- ❖ Након две до шест недеља може доћи до појаве отицања лимфних чворова у препонама које могу прерасти у апсцес са гнојним исцетком. Отекли лимфни чворови у абдомену могу узроковати болове у доњем абдомену или бол у доњем делу леђа.
- ❖ Истовремено можете имати повишену телесну температуру, малаксалост, дрхтавицу, болове у зглобовима и мишићима.

Lymphogranuloma venereum (LGV) - Информациони летак за пацијенте

Да ли је потребно тестирати се?

- ❖ Уколико сте мушкарац који упражњава анални секс са другим мушкарцима или имате симптоме које се могу приписати *LGV*, онда је потребно ради тестирања узети узорак из гениталне регије, и/или ректума како би се поставила тачна дијагноза.
- ❖ Уколико мислите да сте били у контакту са особом која има *LGV*, или друге инфекције, или имате симптоме које се могу приписати *LGV*, онда је индикуван преглед код Вашег лекара опште праксе или надлежног дерматолога.
- ❖ Доктор или обучена медицинска сестра узима брис (узорак) из било које улцерације у гениталној регији и/или ректума код мушкараца који упражњавају анални секс, узорак бриса ће бити послат одговарајућој лабораторији где ће бити тестиран на бактерију која је узрочник *LGV*. Уколико су жлезде натекле може се и из њих узети узорак гноја.
- ❖ Уколико имате *LGV*, такође је потребно да се тестирате на друге полно преносиве болести, као што су ХИВ, сифилис и гонореја (*HIV*, *Syphilis* и *Gonorrhoea*) јер можете имати више од једне инфекције истовремено.

Како се лечи *Lymphogranuloma venereum (LGV)*?

- ❖ Неопходно је да се што раније примени одговарајућа терапија, како би се спречиле могуће компликације и озбиљнији здравствени проблеми.
- ❖ *LGV* се лечи тронедељним циклусом антибиотика, најчешће, доксициклином или еритромицином.

Да ли да упражњавам секс уколико имам *Lymphogranuloma venereum (LGV)*?

- ❖ За време терапије, односно док се сви симптоми не повуку код Вас и Вашег партнера, препоручује се апстиненција (уздржавање од сексуалних односа), односно треба избегавати сваки вид сексуалних односа, чак и са кондомом.

Lymphogranuloma venereum (LGV)- Информациони летак за пацијенте

Које су могуће компликације *Lymphogranuloma venereum* (LGV)?

- ❖ *LGV* ретко када доводи до дуготрајних компликација уколико се реагује на време. Ипак, ако се не лечи, *LGV* може изазвати и системске манифестације са захватањем зглобова, јетре, плућа. Ретко, може довести до инфламације срца или мозга.
- ❖ Уколико се не лечи, *LGV* може довести до инфламације ректалне и гениталне регије са израженим отоцима и улцерацијама који доводе до дугорочног бола и проблема са цревима.

Да ли морам обавестити свог партнера?

- ❖ Уколико имате *LGV*, од кључног је значаја да Ваш садашњи партнер и било који други сексуални партнери, које сте имали у претходна три месеца, буду тестирани и лечени.
- ❖ Циљ овога је да се спречи Ваша реинфекција, као и да Ваши партнери не развију компликације проузроковане инфекцијом.

Додатна помоћ и информације

- ❖ Уколико сумањте да имате *LGV* или неку другу полно преносиву болест, потребно је да се обратите Вашем лекару опште праксе или надлежном дерматологу.

Превели на српски са енглеског оригинала:

Др Игор Капетановић

Др Тамара Митић

Проф. др Милош Николић

Translated into Serbian from the English original:

Igor Kapetanović, MD

Tamara Mitić, MD

Professor Miloš Nikolić, MD, PhD