

Ключевая информация

Лобковый педикулез (фтириаз) относят к инфекциям передаваемым половым путем
Заражение происходит при половом акте и/или при тесном телесном контакте.
Заболевание легко поддается лечению

Что такое лобковый педикулез

- ❖ Лобковый педикулез – инфекция, передающаяся половым путем. Возбудителем является вошь *Phthirus pubis*.

Как заразиться лобковым педикулезом?

- ❖ Вы можете заразиться лобковым педикулезом во время полового акта или тесного телесного контакта с зараженным человеком.
- ❖ Инфекция чаще встречается у молодых людей и людей, часто меняющих половых партнеров.
- ❖ Даже если вы ранее переболели лобковым педикулезом, вы все равно можете заразиться ими снова .

Каковы симптомы лобкового педикулеза?

- ❖ Вы можете обнаружить гниды (яйца) или вшей (взрослые особи), прикрепившиеся к волосам: это могут быть волосы лобковой и перианальной областей; ноги, предплечья, грудь; и редко ресницы, брови, волосы подмышечной области и борода.
- ❖ Они могут вызвать зудящие красные припухлости на окружающей коже.
- ❖ Вы можете увидеть небольшие синие пятна на нижней части живота и бедрах.

Нужны ли мне какие-либо анализы?

- ❖ Нет, обычно диагноз можно поставить, просто осмотрев вас (иногда с помощью лупы).
- ❖ Иногда, при затруднении в постановке диагноза, возможно проведение микроскопии волос для выявления гнид или вшей.
- ❖ Если вы считаете, что контактировали с человеком зараженным лобковым педикулезом или другими инфекциями, или у вас есть симптомы, характерные для лобкового педикулеза, вам следует обратиться к семейному врачу или в местную или в местную клинику сексуального здоровья или дерматовенерологическую клинику.
- ❖ Если у вас выявлен лобковый педикулез, вам следует пройти обследование на другие инфекции, передаваемые половым путем, такие как ВИЧ, сифилис, гонорея и хламидиоз, поскольку у вас может быть более одной инфекции одновременно.

Лобковые вши/педикулез - Информационная брошюра для пациента

Чем лечить лобковый педикулез?

- ❖ При лечении лобкового педикулеза наносят лосьон на все участки тела, ниже шеи, имеющие волосяной покров. Время экспозиции может отличаться в зависимости от того, какой лосьон используется, и может потребоваться повторная обработка через неделю.
- ❖ Возможно назначение таблетированных форм, требующие, при необходимости, повторного приема через неделю.
- ❖ Стирать одежду и постельное белье необходимо при температуре не ниже 50 °С, чтобы убить вшей и гнид. Альтернативно их можно подвергнуть химической чистке или запечатать в полиэтиленовый пакет и хранить в течение 3 дней.
- ❖ Если у вас на ресницах появились вши, вы можете использовать вазелиновую повязку для глаз два раза в день в течение 8–10 дней или удалить вшей с помощью пинцета.

Стоит ли мне заниматься сексом, если у меня выявлен лобковый педикулез?

- ❖ Вам следует избегать любых тесных телесных контактов до тех пор, пока вы и ваш партнер не пройдете курс лечения и ваши симптомы не исчезнут.

Каковы возможные осложнения от лобкового педикулеза?

- ❖ Лобковый педикулез не вызывает осложнений.
- ❖ Иногда первый курс терапии может быть неэффективен. В данном случае необходим повторный курс лечения с заменой препарата.
- ❖ В течение нескольких недель вы можете обнаружить мертвые гниды (яйца) на волосах. Их не нужно удалять и они не требуют дальнейшего лечения.

Лобковый педикулез и беременность

- ❖ Никакого риска для вашей беременности и ребенка нет.

Нужно ли мне говорить об этом своему партнеру?

- ❖ Если у вас обнаружен лобковый педикулез, желательно, чтобы ваш нынешний сексуальный партнер и любой другой сексуальный партнер, который у вас был в течение последнего месяца, были обследованы и пролечены. Это делается для того, чтобы вы не заразились снова.

Дополнительная помощь и информация

- ❖ Если вы подозреваете, что у вас лобковый педикулез или другая инфекция, передаваемая половым путем, обратитесь к семейному врачу или в местную или в местную клинику сексуального здоровья или дерматовенерологическую клинику.