

Mycoplasma - Folleto de información al paciente

Puntos clave

Mycoplasma genitalium es una infección de transmisión sexual (ITS).

Se transmite de una persona a otra durante las relaciones sexuales.

A menudo no causa síntomas.

Puede protegerse usando SIEMPRE condón cuando tenga relaciones sexuales.

¿Qué es el micoplasma ?

- ❖ El micoplasma es una ITS. Es causada por una bacteria llamada *Mycoplasma genitalium*.
- ❖ Esto **NO** es lo mismo que *Mycoplasma hominis*, que **NO** es una infección de transmisión sexual.

¿Cómo se contrae el micoplasma?

- ❖ Puede contraer Mycoplasma cuando tiene relaciones sexuales con alguien que ya tiene la infección. Esto puede ser mediante sexo vaginal, sexo oral o sexo anal.
- ❖ La infección es más común en jóvenes, personas que cambian frecuentemente de pareja sexual y personas que no usan condon durante las relaciones sexuales.
- ❖ Incluso si ya ha tenido Mycoplasma antes, aún puede volver a contraerlo.

¿Cuáles son los síntomas del micoplasma?

Muchas personas que tienen micoplasma no presentan ningún síntoma genital cuando están infectadas. La infección en el recto generalmente no causa ningún síntoma.

- ❖ Los síntomas más comunes en las infecciones vaginales son
 - Un cambio en el color, el olor o la cantidad de secreción de la vagina.
 - Sangrado entre períodos o períodos más abundantes.
 - Sangrado después del sexo
 - Sensación de ardor al orinar
 - Puede haber dolor o malestar en la parte inferior del abdomen.
- ❖ Los síntomas más comunes en las infecciones del pene son
 - Ardor al orinar
 - Descarga desde la punta del pene.
 - Puede haber dolor o malestar en los testículos.

¿Necesito alguna prueba?

- ❖ Por el momento, las pruebas de micoplasma no están disponibles en todos los países ni en todas las clínicas.
- ❖ Se necesita una muestra de la zona genital para realizar el diagnóstico. En algunas clínicas se puede utilizar un análisis de orina.
- ❖ Si cree que ha estado en contacto con micoplasma u otras infecciones, o tiene síntomas que podrían ser Mycoplasma, debe visitar a su médico de cabecera o a su clínica local de salud sexual o venereología/dermatología.

Mycoplasma - Folleto de información al paciente

- ❖ El médico o una enfermera especialista tomará un hisopo (muestra) del pene, la vagina o el cuello uterino (cuello del útero) y lo enviará a un laboratorio donde se analizará para detectar *Mycoplasma genitalium*, si la prueba está disponible. Si ha tenido sexo oral o anal, el médico también puede tomar muestras de su garganta y ano. En algunas situaciones, es posible que usted mismo pueda tomar la muestra.
- ❖ Si tiene Micoplasma, también debe hacerse pruebas para detectar otras infecciones de transmisión sexual como clamidia y gonorrea, VIH, sífilis y hepatitis B, ya que puede tener más de una infección al mismo tiempo.

¿Cuál es el tratamiento para el Micoplasma?

- ❖ Es importante recibir tratamiento para micoplasma lo más rápido posible, ya que la infección puede causar complicaciones y problemas de salud graves si no se trata.
- ❖ Micoplasma se trata con un ciclo de tabletas de antibióticos.
- ❖ Puede ser difícil de tratar, por lo que debe regresar 3 semanas después de haber terminado sus antibióticos para hacerse una prueba y verificar que la infección haya desaparecido.

¿Debo tener relaciones sexuales si tengo Micoplasma?

- ❖ Debe evitar tener relaciones sexuales sin protección hasta que tanto usted como su pareja hayan terminado todo el tratamiento y los síntomas hayan desaparecido.

¿Cuáles son las posibles complicaciones del Micoplasma?

- ❖ Es poco probable que el micoplasma provoque problemas a largo plazo si se trata rápidamente. Sin embargo, sin tratamiento, micoplasma puede causar complicaciones.
- ❖ Las mujeres pueden desarrollar enfermedad inflamatoria pélvica (EPI). Esto puede causar dolor abdominal y pélvico. También puede provocar infertilidad y embarazo ectópico (un embarazo que ocurre fuera del útero). Los hombres pueden desarrollar una infección dolorosa en los testículos.
- ❖ En casos raros, Micoplasma puede causar otros síntomas como artritis (articulaciones hinchadas) e inflamación de los ojos. Esto es más común en los hombres.

Mycoplasma y embarazo

- ❖ Si está embarazada, Micoplasma puede transmitirse de usted a su bebé durante el parto. No se sabe si esto causa algún problema al bebé.

¿Tengo que decírselo a mi pareja?

- ❖ Si tiene Micoplasma, es esencial que su pareja sexual actual sea examinada y tratada.
- ❖ Esto es para evitar que usted vuelva a contraer la infección y también para que sus parejas no desarrollen complicaciones.

Más ayuda e información

- ❖ Si sospecha que tiene Mycoplasma o cualquier otra infección de transmisión sexual, consulte a su médico de cabecera o a una clínica local de salud sexual o venereología/dermatología.

Copyright © IUSTI 2024

Fecha de publicación: 2024

Sitio web: <http://www.iusti.org/>

Mycoplasma - Folleto de información al paciente

Copyright © IUSTI 2024

Fecha de publicación: 2024

Sitio web: <http://www.iusti.org/>

